ЛП-№(015610)-(РГ-RU) от 01.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12137
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Анти-Ангин Формула, спрей для местного применения дозированный

Действующие вещества: тетракаин + хлоргексидин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Анти-Ангин Формула, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Анти-Ангин Формула.

3. Применение препарата Анти-Ангин Формула.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Анти-Ангин Формула.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Анти-Ангин Формула, и для чего его применяют

Препарат Анти-Ангин Формула содержит действующие вещества тетракаин и хлоргексидин и относится к группе препаратов «препараты для лечения заболеваний горла; антисептики».

Показания к применению

Препарат Анти-Ангин Формула применяется у взрослых и детей в возрасте от 10 до 18 лет для:

- профилактики, этиотропного (направленное на причину болезни) и симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки, вызванных чувствительными к хлоргексидину микроорганизмами: фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки), тонзиллит (воспаление небных миндалин), начальная стадия ангины, пародонтоз (нарушение кровоснабжения и питания тканей, окружающих зубы), стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), гингивит (воспаление десен), состояние после тонзиллэктомии (операция по удалению небных миндалин) или экстракции (удаление) зуба и др.;
- комплексной терапии ангины (острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением небных миндалин) (применять при первых признаках заболевания – при боли в горле и першении).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12137
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Способ действия препарата Анти-Ангин Формула

Хлоргексидин подавляет рост и размножение бактерий (бактериостатическое действие), а также вызывает их гибель (бактерицидное действие).

Тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, через 3 дня необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Анти-Ангин Формула

Противопоказания

Не применяйте препарат Анти-Ангин Формула:

- если у Вас аллергия на тетракаин, хлоргексидин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас повреждение или воспаление слизистых оболочек;
- на области, имеющие богатое кровоснабжение (высоковаскуляризированные области);
- у детей в возрасте от 0 до 10 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Анти-Ангин Формула проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу до начала или во время применения препарата Анти-Ангин Формула:

- Вы беременны или кормите ребенка грудью;
- у Вас заболевание, при котором повышен уровень сахара (глюкозы) в крови (сахарный диабет);
- у Вас наследственное заболевание, при котором нехватка фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы приводит к преждевременному разрушению клеток крови эритроцитов (дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);
- у Вас заболевание, при котором в организме накапливается избыточное количество железа (гемохроматоз);
- у Вас заболевание крови, при котором организм не может нормально использовать железо для производства гемоглобина (сидеробластная анемия);
- у Вас заболевание крови, при котором нарушается образование гемоглобина (талассемия);
- у Вас повышенный уровень солей щавелевой кислоты (оксалатов) в моче (гипероксалурия);
- у Вас заболевание, при котором повышенный уровень оксалатов приводит к отложению кристаллов оксалата кальция в почках и других органах (оксалоз);
- у Вас камни в почках (мочекаменная болезнь почек).

Спрей не следует вдыхать. Избегайте попадания препарата в глаза.

Если через 3 дня после начала лечения симптомы заболевания не исчезают или наблюдается ухудшение течения заболевания, обратитесь к врачу. Врач определит целесообразность дальнейшего применения препарата Анти-Ангин Формула.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12137
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Дети

Дети могут применять препарат с 10 лет, при этом ребенок должен быть способен задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Препарат Анти-Ангин Формула противопоказан детям в возрасте от 0 до 10 лет (см. раздел 2, подраздел «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Анти-Ангин Формула

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете что-то из перечисленного далее, поскольку следующие лекарственные средства могут взаимодействовать с препаратом Анти-Ангин Формула:

- препараты, содержащие сахарозу, полисорбат 80, нерастворимые соли магния, цинка и кальция, так как они уменьшают действие хлоргексидина;
- сульфаниламидные препараты (антибиотики), как как тетракаин снижает их антибактериальную активность;
- сосудосуживающие средства, так как они удлиняют эффект тетракаина;
- лекарственные средства, подавляющие (ингибирующие) фермент холинэстеразу, такие как антимиастенические средства (применяются для лечения миастении – усиливают нервные сигналы к мышцам), противоопухолевые препараты циклофосфамид и тиотепа, поскольку эти препараты снижают метаболизм тетракаина и повышают его токсичность;
- антикоагулянты (кроверазжижающие препараты), такие как далтепарин натрия, эноксапарин натрия, гепарин натрия, варфарин, поскольку эти препараты повышают риск развития кровотечений;
- лекарственные средства, подавляющие (ингибирующие) фермент моноаминоксидазу, такие как фуразолидон (противомикробный препарат), прокарбазин (противоопухолевый препарат), селегилин (применяется для лечения болезни Паркинсона), так как при их одновременном применении с тетракаином повышается риск снижения артериального давления;
- миорелаксирующие лекарственные средства (применяются для снижения тонуса мышц), поскольку тетракаин усиливает и удлиняет их эффект;
- бета-адреноблокаторы (применяются при нарушениях работы сердца), поскольку они замедляют метаболизм тетракаина, увеличивая его токсичность (снижение печеночного кровотока).

Не применяйте препарат Анти-Ангин Формула одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применяйте препарат Анти-Ангин Формула при беременности и в период грудного вскармливания только после консультации с врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12137
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применяйте препарат Анти-Ангин Формула не позднее, чем за 30 минут до начала управления транспортным средством. При соблюдении данной рекомендации препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит аспартам

Данный лекарственный препарат содержит 0,2 мг аспартама в каждой дозе спрея. Аспартам является источником фенилаланина. Он может быть вреден, если у Вас фенилкетонурия (ФКУ) – редкое генетическое нарушение, при котором накапливается фенилаланин из-за неспособности организма правильно выводить его.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит этанол

Данный лекарственный препарат содержит 80 мг спирта этилового (этанола) в каждой дозе спрея. Количество в дозе данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 2 мл пива или 0,8 мл вина. Небольшое количество спирта в данном лекарственном препарате не будет оказывать заметного действия.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит пропилпарагидроксибензоат

Данный лекарственный препарат содержит пропилпарагидроксибензоат, который может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

3. Применение препарата Анти-Ангин Формула

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Взрослые

По 1–2 впрыскивания на применение до 6 раз в день.

Применение у детей

Дети в возрасте от 15 до 18 лет

Режим дозирования для детей в возрасте от 15 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Дети в возрасте от 10 до 15 лет

По 1–2 впрыскивания на применение до 3 раз в день.

Путь и (или) способ введения

Местно. Распылите препарат на слизистую оболочку полости рта и горла при задержке дыхания.

Продолжительность терапии

Курс лечения составляет не более 5 дней.

Если Вы применили препарата Анти-Ангин Формула больше, чем следовало

При передозировке препаратом Анти-Ангин Формула у Вас может наблюдаться головокружение, общая слабость, синюшность кожи и слизистых оболочек (цианоз), возбуждение, беспокойство, дрожание частей тела (тремор), нарушение дыхания, тошнота, рвота. При появлении этих симптомов, **сообщите лечащему врачу**. При передозировке препаратом необходимо промыть желудок. Врач назначит Вам лечение, направленное на

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12137
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

уменьшение симптомов (симптоматическое лечение), а также солевые слабительные препараты.

Если Вы забыли применить препарат Анти-Ангин Формула

При пропуске дозы, примените препарат Анти-Ангин Формула, как только об этом вспомните. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Анти-Ангин Формула может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Анти-Ангин Формула и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения **аллергических реакций**.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Анти-Ангин Формула

- жжение слизистой оболочки полости рта.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Анти-Ангин Формула

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на этикетке флакона или картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Анти-Ангин Формула содержит

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12137
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Действующими веществами являются тетракаин и хлоргексидин.

Каждая доза спрея содержит 0,12 мг тетракаина гидрохлорида и 0,24 мг хлоргексидина биглюконата (в виде 20 % раствора хлоргексидина биглюконата).

Каждые 100 г спрея содержат 0,06 г тетракаина гидрохлорида и 0,12 г хлоргексидина биглюконата (в виде 20 % раствора хлоргексидина биглюконата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: глицерин, этиловый спирт 96 %, аспартам, ароматическая добавка «Мята» (жидкость (пропиленгликоль (Е1520), масло мяты, ментол, анисовое масло, эвкалиптол натуральный), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), лимонная кислота безводная, вода очищенная.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит аспартам, этанол (этиловый спирт), пропилпарагидроксибензоат (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Анти-Ангин Формула и содержимое упаковки

Спрей для местного применения дозированный.

Бесцветная жидкость с запахом мяты.

По 25 мл препарата в полимерном флаконе из полиэтилена высокой плотности, укупоренном насадкой-распылителем с защитным колпачком. По одному флакону с наклеенной этикеткой вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Бауш Хелс»

115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Телефон: +7 (495) 510-28-79

Производитель

Республика Беларусь

ООО «Рубикон»

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «Бауш Хелс»

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Телефон: +7 (495) 510-28-79

Адрес электронной почты: office.ru@bausch.com

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).