ЛП-№(015487)-(РГ-RU) от 25.06.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Анти-Ангин Формула, 0,2 мг + 2 мг + 50 мг, таблетки для рассасывания

Действующие вещества: тетракаин + хлоргексидин + [аскорбиновая кислота]

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Анти-Ангин Формула, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Анти-Ангин Формула.

3. Применение препарата Анти-Ангин Формула.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Анти-Ангин Формула.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Анти-Ангин Формула, и для чего его применяют

Препарат Анти-Ангин Формула содержит действующие вещества тетракаин, хлоргексидин, аскорбиновую кислоту и относится к группе препаратов «препараты для лечения заболеваний горла; антисептики».

Показания к применению

Препарат Анти-Ангин Формула применяется у взрослых и детей в возрасте от 5 лет для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), гингивит (воспаление десен), тонзиллит (воспаление небных миндалин), фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки), пародонтоз (нарушение кровоснабжения и питания тканей, окружающих зубы), начальная стадия ангины (острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением небных миндалин), состояние после тонзилэктомии (операция по удалению небных миндалин) или экстракции (удаление) зуба и др.

Способ действия препарата Анти-Ангин Формула

Хлоргексидин подавляет рост и размножение бактерий (бактериостатическое действие), а также вызывает их гибель (бактерицидное действие).

Тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Аскорбиновая кислота участвует в процессе образования коллагена и восстановления (регенерации) тканей, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Анти-Ангин Формула

Противопоказания

Не применяйте препарат Анти-Ангин Формула:

- если у Вас аллергия на тетракаин, хлоргексидин, аскорбиновую кислоту или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас I триместр беременности;
- у детей в возрасте от 0 до 5 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Анти-Ангин Формула проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу до начала или во время применения препарата Анти-Ангин Формула:

- у Вас II или III триместр беременности;
- Вы кормите ребенка грудью;
- у Вас заболевание, при котором повышен уровень сахара (глюкозы) в крови (сахарный диабет);
- у Вас наследственное заболевание, при котором нехватка фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы приводит к преждевременному разрушению клеток крови эритроцитов (дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);
- у Вас заболевание, при котором в организме накапливается избыточное количество железа (гемохроматоз);
- у Вас заболевание крови, при котором организм не может нормально использовать железо для производства гемоглобина (сидеробластная анемия);
- у Вас заболевание крови, при котором нарушается образование гемоглобина (талассемия);
- у Вас повышенный уровень солей щавелевой кислоты (оксалатов) в моче (гипероксалурия);
- у Вас заболевание, при котором повышенный уровень оксалатов приводит к отложению кристаллов оксалата кальция в почках и других органах (оксалоз);
- у Вас камни в почках (мочекаменная болезнь почек).

Не рекомендуется применять препарат Анти-Ангин Формула одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод).

Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов. При сдаче анализов сообщите медицинскому персоналу о том, что Вы применяете препарат Анти-Ангин Формула.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Длительное применение препарата может вызвать незначительное временное окрашивание зубов и языка, но эти явления проходят после отмены препарата. В ряде случаев для их устранения может потребоваться консультация врача.

Если у Вас есть заболевания пищеварительного тракта и/или печени, при применении препарата у Вас могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, рвота или отрыжка. При появлении этих симптомов прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Препарат может повлиять на результаты антидопингового контроля.

Дети и подростки

Препарат Анти-Ангин Формула противопоказан детям в возрасте от 0 до 5 лет (см. раздел 2, подраздел «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Анти-Ангин Формула

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете что-то из перечисленного далее, поскольку следующие лекарственные средства могут взаимодействовать с препаратом Анти-Ангин Формула:

- сульфаниламидные препараты (антибиотики), как как тетракаин снижает их антибактериальную активность;
- сосудосуживающие средства, так как они удлиняют эффект тетракаина;
- бензилпенициллин и тетрациклины (антибиотики), поскольку аскорбиновая кислота повышает их концентрацию в крови;
- салицилаты (применяются при боли, воспалении и повышенной температуре) и сульфаниламиды короткого действия (антибиотики), так как аскорбиновая кислота увеличивает риск развития кристаллов солей в моче (кристаллурия) при одновременном применении с этими препаратами;
- пероральные контрацептивы (принимаются внутрь для предотвращения нежелательной беременности), поскольку аскорбиновая кислота снижает их концентрацию в крови.
- Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не применяйте препарат Анти-Ангин Формула в I триместре беременности.

Во II и III триместрах беременности применяйте препарат Анти-Ангин Формула только по назначению врача, который знает о Вашей беременности.

Грудное вскармливание

Применяйте препарат Анти-Ангин Формула в период кормления грудью только после консультации с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Анти-Ангин Формула не оказывает влияние на способность управлять

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в каждой таблетке, то есть, по сути, не содержит натрия.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит сорбитол

Данный лекарственный препарат содержит 916,3 мг сорбитола в каждой таблетке. Если лечащий врач сообщил, что у Вас или Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров или диагностирована наследственная непереносимость фруктозы (ННФ) – редкое генетическое нарушение, при котором человек не может усваивать фруктозу, прежде чем Вы или Ваш ребенок начнете применять данный лекарственный препарат, посоветуйтесь с лечащим врачом. Также сорбитол может вызывать неприятные ощущения в животе и оказывать легкое слабительное действие.

Препарат Анти-Ангин Формула содержит краситель тартразин (Е-102)

Данный лекарственный препарат содержит краситель тартразин, который может вызывать аллергические реакции, а также оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

3. Применение препарата Анти-Ангин Формула

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

6 таблеток в день с интервалом 2 часа.

Применение у детей и подростков

Подростки в возрасте от 15 до 18 лет

Режим дозирования для подростков в возрасте от 15 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Дети и подростки в возрасте от 10 до 15 лет

4 таблетки в день с интервалом 3 часа.

Дети в возрасте от 5 до 10 лет

3 таблетки в день с интервалом 4 часа.

Путь и (или) способ введения

Местно. Держите во рту до полного рассасывания.

Препарат принимают после еды и после чистки зубов. Рекомендуется не полоскать рот и не пить много жидкости в течение 2 часов после рассасывания таблеток.

Продолжительность терапии

Курс лечения – не более 5 дней.

Продолжительность применения препарата Анти-Ангин Формула определит лечащий врач.

Если Вы применили препарата Анти-Ангин Формула больше, чем следовало

При передозировке препаратом Анти-Ангин Формула у Вас может наблюдаться головокружение, общая слабость, синюшность кожи и слизистых оболочек (цианоз), возбуждение, беспокойство, дрожание частей тела (тремор), нарушение дыхания, тошнота,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

рвота. При появлении этих симптомов, **сообщите лечащему врачу.** При передозировке препаратом необходимо промыть желудок. Врач назначит Вам лечение, направленное на уменьшение симптомов (симптоматическое лечение), а также солевые слабительные препараты.

Если Вы забыли применить препарат Анти-Ангин Формула

При пропуске таблетки, примените препарат Анти-Ангин Формула, как только об этом вспомните. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Анти-Ангин Формула может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Анти-Ангин Формула и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- аллергические реакции;
- тяжелые аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, отек лица, губ или век, затрудненное дыхание, охриплость голоса, лающий кашель, боль в животе, чувство тревоги (симптомы анафилаксии);

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Анти-Ангин Формула:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- изменение вкуса;
- увеличение зубного налета;
- изменение окраски (коричневые пятна) на зубах, пломбах и зубных протезах;
- повреждение зубной эмали (при интенсивном потреблении);
- раздражение или воспаление слизистой оболочки рта;
- раздражение слизистой оболочки желудка;
- понос (диарея);
- тошнота;
- рвота;
- отрыжка.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Анти-Ангин Формула

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере или картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и влаги месте.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Анти-Ангин Формула содержит

Действующими веществами являются тетракаин, хлоргексидин и аскорбиновая кислота.

Каждая таблетка для рассасывания содержит 0,2 мг тетракаина гидрохлорида, 2 мг хлоргексидина диацетата и 50 мг аскорбиновой кислоты.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: левоментол, сахаринат натрия, сорбитол, тальк, кальция стеарат, ароматизатор «апельсиновый» (мальтодекстрин, апельсиновое масло, аравийская камедь (Е414), ароматическая композиция), краситель тартразин (Е-102).

Препарат Анти-Ангин Формула содержит натрий, сорбитол, краситель тартразин (Е-102) (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Анти-Ангин Формула и содержимое упаковки

Таблетки для рассасывания.

Таблетки двояковыпуклые, от бледно-желтого до желтовато-оранжевого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, с апельсиново-ментоловым ароматом.

По 6 таблеток в блистере ПВХ/ПВДХ/Ал.

По 2, 3, 4 блистера в картонной пачке с листком-вкладышем.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Бауш Хелс»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11714
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Телефон: +7 (495) 510-28-79

Производитель

Республика Беларусь

ООО «Рубикон»

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «Бауш Хелс»

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Телефон: +7 (495) 510-28-79

Адрес электронной почты: office.ru@bausch.com

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).