ЛП-№(014486)-(РГ-RU) от 14.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2026 № 7300
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Листок-вкладыш – информация для пациента

ЭВКАЛИПТ-М, 6 мг + 5,5 мг, таблетки для рассасывания

Действующие вещества: левоментол + эвкалипта листьев масло

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ЭВКАЛИПТ-М, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата ЭВКАЛИПТ-М.
3. Прием препарата ЭВКАЛИПТ-М.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЭВКАЛИПТ-М.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат ЭВКАЛИПТ-М, и для чего его применяют

Препарат ЭВКАЛИПТ-М содержит действующие вещества левоментол и эвкалипта листьев масло и относится к группе препаратов для лечения заболеваний горла; антисептики.

Показания к применению

Препарат ЭВКАЛИПТ-М применяется у взрослых и детей в возрасте от 8 до 18 лет для лечения воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и глотки (воспаление слизистой оболочки глотки (фарингит), воспаление слизистой оболочки гортани (ларингит), воспаление слизистой оболочки трахеи (трахеит)).

Способ действия препарата ЭВКАЛИПТ-М

Препарат ЭВКАЛИПТ-М оказывает противовоспалительное и антисептическое (уничтожает патогенные микроорганизмы) действие в горле.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2026 № 7300
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

2. О чем следует знать перед приемом препарата ЭВКАЛИПТ-М

Противопоказания

Не принимайте препарат ЭВКАЛИПТ-М:

- если у Вас аллергия на левоментол, эвкалипта листьев масло или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ЭВКАЛИПТ-М проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5 дней, сообщите об этом лечащему врачу.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 8 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат ЭВКАЛИПТ-М

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете:

- препараты для лечения сахарного диабета (антидиабетические препараты), так как при их одновременном приеме с эвкалиптом возможно снижение уровня глюкозы в крови и развитие симптомов, характерных при низком уровне глюкозы: выраженное чувство голода, холодный пот, слабость, чувство тревоги, учащенное сердцебиение, дрожь в конечностях (симптомы гипогликемии);
- растения, содержащие пирролизидиновые алкалоиды (например, крестовник, бузульник); следует избегать совместного применения с препаратом ЭВКАЛИПТ-М, так как эвкалипт может увеличивать токсичность этих растений, что приводит к повреждению печени.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не следует применять препарат ЭВКАЛИПТ-М во время беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Прием препарата ЭВКАЛИПТ-М не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Препарат ЭВКАЛИПТ-М содержит сорбитол

Данный лекарственный препарат содержит 1044,77 мг сорбитола в каждой таблетке для рассасывания.

Сорбитол является источником фруктозы. Если лечащий врач сообщил, что у Вас или Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров или у Вас диагностирована наследственная

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2026 № 7300
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

непереносимость фруктозы (ННФ) – редкое генетическое нарушение, при котором человек не может усваивать фруктозу, прежде чем Вы или Ваш ребенок начнете получать данный лекарственный препарат, посоветуйтесь с лечащим врачом.

3. Прием препарата ЭВКАЛИПТ-М

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Взрослые

По 1 таблетке 3–4 раза в день.

Применение у детей и подростков

Рекомендуемая доза препарата у детей в возрасте от 8 до 18 лет составляет 1–2 таблетки в день.

Путь и (или) способ введения

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Продолжительность терапии

Длительность лечения у взрослых и детей не должна превышать 5 дней.

Если Вы приняли препарата ЭВКАЛИПТ-М больше, чем следовало

При приеме препарата в соответствии с листком-вкладышем передозировка маловероятна. Если Вы или Ваш ребенок случайно приняли слишком много препарата ЭВКАЛИПТ-М, обратитесь к врачу. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Если Вы забыли принять препарат ЭВКАЛИПТ-М

Если Вы забыли принять препарат ЭВКАЛИПТ-М, примите таблетку обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата ЭВКАЛИПТ-М и обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения или усугубления следующих или появлении иных нежелательных реакций:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- нарушение нормальной деятельности желудка, затруднённое или болезненное пищеварение (диспепсические явления).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2026 № 7300
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, д. 13
Телефон: +7 7172 235-135
Электронная почта: pdlc@dari.kz
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ndda.kz

5. Хранение препарата ЭВКАЛИПТ-М

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат ЭВКАЛИПТ-М содержит

Действующими веществами являются левоментол и эвкалипта листьев масло.

Каждая таблетка содержит 6 мг левоментола и 5,5 мг эвкалипта листьев масло (эвкалиптовое масло).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются сорбитол, кремния диоксид, магния стеарат, сахарин, ароматизатор «медовый», краситель индигокармин Е-132, краситель хинолиновый желтый Е-104.

Препарат ЭВКАЛИПТ-М содержит сорбитол (см. раздел 2).

Внешний вид препарата ЭВКАЛИПТ-М и содержимое упаковки

Таблетки для рассасывания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.04.2026 № 7300
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Таблетки плоские круглые со скошенным краем, светло-зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, с запахом ментола и эвкалипта. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева

По 10 таблеток в блистере ПВХ/ПВДХ/Ал; по 2 блистера в картонной пачке с листком-вкладышем.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «Бауш Хелс»
115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н
Телефон: +7 (495) 510-28-79

Производитель

Швейцария
СвиссКо Сервисез АГ
Зиссельн АГ, Банхофштрассе 14, 4334

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «Бауш Хелс»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н
Телефон: +7 (495) 510-28-79
Электронная почта: office.ru@bausch.com

Республика Казахстан
ТОО «Бауш Хелс»
A26T9G0, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 22/5
Телефон: + 7 727 3 111 516
Электронная почта: office.kz@bausch.com

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).