

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **АНТИ-АНГИН® ФОРМУЛА**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N015460/02 от 12.12.2008 г.

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: АНТИ-АНГИН® ФОРМУЛА

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ:

Тетракаин + Хлоргексидин + Аскорбиновая кислота &

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: пастилки



СОСТАВ НА ОДНУ ПАСТИЛКУ:

Активные вещества:

Хлоргексидина дигидрат.....2,00 мг

Тетракаина гидрохлорид.....0,20 мг

Аскорбиновая кислота.....50,00 мг

Вспомогательные вещества: декстрозы сироп, сахароза, левоментол, ароматизатор масло мятное, анетол, ароматизатор банановый, краситель кармин красный Е 120, вода очищенная.

ОПИСАНИЕ:

Плоские круглые, со скошенным краем пастилки с шероховатой поверхностью от розового до розовато-красного цвета со специфическим запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Антисептическое средство + местноанестезирующее средство.

Код АТХ: [R02AA20]



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Хлоргексидин оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие.

Обладает широким антибактериальным спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, активен в отношении *Candida albicans*. Хлоргексидин особенно активен в отношении *Streptococcus mutans*, *Streptococcus salivarius*, *Escherichia coli* и анаэробных бактерий. Менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как *Streptococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Veillonella spp.*

Анестетик тетракаин оказывает местноанестезирующее действие. Анестезирующий эффект наступает через 1-2 минуты после применения.

Аскорбиновая кислота участвует в процессе синтеза коллагена и тканевой регенерации, регулировании окислительно-восстановительных процессов, усиливает иммунные реакции. За счет снижения проницаемости капилляров, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.



ПОКАЗАНИЯ:

Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (в том числе тонзиллита, фарингита, начальной стадии ангины, стоматита, гингивита, пародонтоза, состояния после тонзиллэктомии или экстракции зуба).



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 5 лет, I триместр беременности, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, гиперчувствительность (в том числе к другим местноанестезирующим лекарственным средствам группы эфиров или парааминобензойной кислоте и ее производным).

С осторожностью: во II и III триместрах беременности по назначению врача, в период лактации, при сахарном диабете, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматозе, сидеробластной анемии, талассемии, гиперкальциемии, оксалоэзии и мочекаменной болезни.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Местно. Медленно рассасывать до полного растворения во рту.

– Взрослые и дети с 15 лет: по 1 пастилке каждые 2 часа, но не более 6 пастилок в день.

– Дети с 10 до 15 лет: по 1 пастилке каждые 3 часа, но не более 4 пастилок в день.

– Дети с 5 до 10 лет: по 1 пастилке каждые 4 часа, но не более 3 пастилок в день.

Курс лечения составляет не более 5 дней.



ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Возможны аллергические реакции (у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата).

Превышение рекомендуемого срока терапии может вызвать кратковременное нарушение вкуса; также возможно повреждение зубной эмали (окрашивание, отложение зубного камня).



ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Симптомы: головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.

Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая терапия.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

Хлоргексидин не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Не рекомендуется одновременное применение с йодом. Этанол усиливает эффект препарата.

Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов.

Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина.

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов.

Улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа. Снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов. Увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов.



ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод). Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится 1,4 г сахарозы, что соответствует 0,12 ХЕ.

Согласно фармакологическим свойствам, препарат не оказывает влияния на виды деятельности, требующие повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение препарата более 5 дней нежелательно из-за возможного нарушения нормальной микрофлоры полости рта и глотки. Не следует принимать таблетки непосредственно перед приемом пищи или во время еды. После приема препарата не рекомендуется чистить зубы, поскольку содержащиеся в зубной пасте поверхностно-активные вещества способны инактивировать хлоргексидин.

Препарат может повлиять на результаты антидопингового контроля.



ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки.

По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистере ПВХ/АI.

По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!



СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

Не применять по истечении срока годности.



УСЛОВИЯ ОТПУСКА: без рецепта.



ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производитель готовой лекарственной формы, фасовщик, упаковщик:

Др. мед. Ауфдермаур АГ, Вестштрассе 16, 5426 Ленгнау АГ, Швейцария.

Выпускающий контроль качества:

Натур Продукт Европа Б.В., Доктерскампстраат 5, 5222 АМ Хертогенбос, Нидерланды.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ООО «Бауш Хелс», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

Тел./факс: +7 (495) 510-28-79

8023,0920, P1RU01

**Natur
Produkt**